

La Brucellose Bovine

01

Description

- **Bactérie:** *Brucella abortus*
- **Très résistante** dans le milieu extérieur
- **Résiste** à de nombreux désinfectants
- **Sensible** aux UV et à la chaleur
- **Zoonose**, rare mais dépistage annuel obligatoire et si avortements

02

Symptômes

- **Durée d'incubation:** De quelques jours à plusieurs mois
- **Plupart des animaux** restent **sans symptômes** mais **excrètent la bactérie** toute leur vie

Signe cliniques:

- Avortements au dernier tiers de gestation
- Orchites chez les mâles
- Gestation menées à terme avec des nouveaux nés viables son possibles

03

Transmission

- **Contact cutané** par les muqueuses ou par consommation de lait cru

Indirect:

- Matériel d'élevage
- Locaux
- Véhicules
- Fumier
- Pâtures et cours d'eau

04

Traitement

- Pas de traitement

06

Impacts

- Pertes économiques

Zoonose professionnelle:

- Incubation : 1 à 3 semaines
- Syndrome pseudo-grippal aigu
- Formes localisées
 - Atteintes articulaires
 - Atteintes neurologiques
- Formes chroniques
 - Fatigue intense
 - Douleurs articulaires persistantes
 - Risque d'avortement chez la femme enceinte

05

Que faire en prévention ?

- **Respect** de la **prophylaxie** obligatoire
- **Déclaration** de tous les avortements
- **Introduction** d'animaux provenant de **troupeaux indemnes**
- Prendre des **précautions d'hygiène** lors de la mise-bas

